

معلومات حول اللقاح الواقي ضد فيروس سارس - كوف 2 باستخدام مادة اللقاح الواقي الذي يعتمد على مرسال الحمض النووي الريبوزي - كوميرناتي® من إنتاج شركة بيونتك ذات المسؤولية المحدودة / شركة فايزر

أولياء الأمور الأعزاء!

استنادا على توصيات هيئة التطعيم الوطنية بعد موافقة وكالة الأدوية الأوروبية EMA، يُنصح بتطعيم جميع الأطفال والشباب ضد سارس - كوف 2 المسبب لمرض كوفيد - 19 ابتداء من سن 5 سنوات. ويتم إجراء التطعيم الواقي باستخدام مادة اللقاح الواقي الذي يعتمد على مرسال الحمض النووي الريبوزي - كوميرناتي® من إنتاج شركة بيونتك ذات المسؤولية المحدودة / شركة فايزر، ويتم تقديمه بشكل مجاني للأطفال ابتداء من الصف الدراسي الأول في إطار خطة تطعيم للأطفال.

وكما هو معروف حاليا، تتم إثارة مرض كوفيد - 19 من خلال فيروس سارس - كوف 2 على شكل موجات مرض عالمية. وينتقل هذا الفيروس من شخص إلى شخص عبر الهباء الجوي / إفرازات دقيقة من المجاري التنفسية ومنطقة البلعوم الأنفي. هذا يعني أنه يمكن للأشخاص الحاملين لهذا الفيروس في أغشيتهم المخاطية بمنطقة الأنف والبلعوم نقل العدوى لأشخاص آخرين من خلال ممارستهم لأفعال تنتج الهباء الجوي كالسعال والعطس والصراخ والغناء أو حتى التقبيل. ويحدث هذا الانتقال عادة في الأماكن التي فيها اتصال جسدي وثيق بين الناس.

وغالبا ما يسبب هذا الفيروس في بادئ الأمر أعراضا في منطقة الجهاز التنفسي العلوي (التهاب في الحلق، سعال)، مما يمكن أن يترتب عليه نتيجة ذلك ظهور أعراض أخرى في الجهاز التنفسي السفلي وأنسجة الرئة (ضيق في التنفس)، مصحوبة في بعض الأحيان بأعراض مألوفة تشبه عدوى الانفلونزا كالحُمى والتهاب الحلق وآلام في الأطراف والتعب والإرهاق. ويمكن فقدان حاستي الذوق والشم بشكل مؤقت وحدث شكاوى في الجهاز الهضمي أيضا.

وكما ذكر سابقا، يتخذ المرض مسارات سريرية مختلفة، ابتداء من أعراض الزكام المصحوبة بالحمى وصولا إلى استجابات التهابية عضوية تشكل خطرا على حياة الإنسان، كالمتلازمة الالتهابية متعددة الأجهزة عند الأطفال (C - MIS)، ويمكن لهذا المرض أن يترك عواقب طويلة الأمد أيضا، كمرض فيروس كورونا طويل الأمد مسببا، بما في ذلك، تداعيات وأضرار من خلال أعراض جسدية وعصبية ونفسية.

وبالنسبة لكبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، فيمكن للمرض أن يتخذ مسارات حادة مسببا قيودا شديدة ومشاكل في الجهاز التنفسي. وعموما، لا يوجد أعراض محددة لمرض كوفيد - 19، ولذلك، فلا يمكن تمييز هذا المرض عن أمراض فيروسية أخرى من خلال وجود أعراض فقط. وبالتالي، لا يمكن إعطاء تشخيص موثوق إلا من خلال اختبار مخبري مناسب.

مادة اللقاح الواقي المستخدمة حاليا ضد سارس - كوف 2 هي مادة اللقاح الواقي كوميرناتي® التي تعتمد على مرسال الحمض النووي الريبوزي. وتتكون مواد لقاح الحمض النووي الريبوزي من الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) الذي يحتوي على المعلومات الجينية، وبالتالي، خطة البناء، لبروتين سبايك، الهيكل السطحي للفيروس. ويتم إنتاج الحمض النووي الريبوزي المرسال بشكل انزيمي من خلال النسخ في المختبر.

وبهدف تثبيت جزيئات الحمض النووي الريبوزي المرسال واستقبالها في خلايا الجسم بشكل فعال، يتم تغليفها بجزيئات نانوية دهنية. وبعد الاستقبال، يتم في سيتوبلازما خلايا الجسم إنتاج بروتين سبايك من الحمض النووي الريبوزي المرسال من خلال عمليات تخليق البروتين في الخلية. وبعد عملية تخليق البروتين، يتم هدم الحمض النووي الريبوزي المرسال التابع لمادة اللقاح و الحمض النووي الريبوزي المرسال التابع للخلية بشكل سريع. وينظر الجهاز المناعي إلى "بروتين سبايك" الذي تم إنتاجه في خلية الجسم كبروتين تابع لجسم غريب مكونا رد فعل مناعي خاص ضده.

اقلب الصفحة من فضلك - شكرا!

الجرعة للأطفال والشباب من 5 حتى 12 سنة

يتم إعطاء كوميرناتي® بعد التخفيف في العضل من خلال سلسلة تطعيم أولية تتكون من جرعتين (وتوازي كل واحدة من هذه الجرعات مقدار ثلث جرعة للبالغين). وينصح بإعطاء الجرعة الثانية بعد الجرعة الأولى بثلاثة أسابيع. أما بالنسبة لقرار متى ولمن يجب إعطاء الجرعة المعززة (الجرعة الثالثة) من لقاح كوميرناتي® بعد فترة من الزمن في العضل، فيجب اتخاذه بناء على البيانات المتوفرة حول فعالية مادة اللقاح مع أخذ عدد البيانات الأمنية المتزايدة بشكل مستمر بعين الاعتبار.

الأعراض الجانبية

ويمكن أن يكون للقاحات الواقية ردود فعل أو حتى أعراض جانبية. ويوجد أعراض تظهر بشكل متكرر كآلام الرأس والمفاصل والعضلات، وآلام في مكان الحقن، والتعب. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يحدث ارتجاف، وحمى، وورم واحمرار في مكان الحقن. وتعتبر إمكانية ظهور أعراض جانبية بعد الجرعة الثانية أعلى.

وتُرفق تعليمات استخدام مادة اللقاح الواقية مع هذا المنشور لتوفر لكم معلومات حول تركيبة لقاح كوميرناتي®، والموانع الممكنة لاستخدامه، وأعراضه الجانبية. وتتم مراقبة ردود الفعل الجسدية المباشرة التي يمكن أن تظهر على طفلك بعد حصوله على لقاح كوميرناتي® الواقية من خلال مرحلة مراقبة لمدة 15 دقيقة، بحيث يمكن في هذه الحالة وضعها تحت السيطرة.

يُرجى تبليغ طبيبك أو طبيبتك أو المكتب الاتحادي للأمن الصحي (BASG) بجميع ردود الفعل أو الأعراض التي تظهر في غضون 14 يوماً على البريد الإلكتروني التالي: nebenwirkung@basg.gv.at وكذلك عبر الرابط التالي:

<https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/meldewesen/nebenwirkungen>

تنظيم التطعيم باستخدام لقاح كوميرناتي®

لا يمكن إجراء التطعيم من قبل طبيبات وأطباء المدرسة التابعين لقسم الخدمات الصحية في مدينة فيينا (MA 15) إلا من خلال إقرار موافقة من قبل أولياء الأمور. ومع ذلك، فإن هذه الموافقة لا تعني حصول طفلك على اللقاح في جميع الأحوال، إذ يتم اتخاذ هذا القرار من قبل الطبيب المسؤول وفقاً لبيانات السيرة المرضية لطفلك. إذا تعرّض طفلك خلال الفترة ما بين تعبئة إقرار الموافقة وموعد التطعيم الفعلي إلى مرض ما أو حصل على لقاحات أخرى، فيُرجى تبليغ الطبيب أو الطبيبة أو مُدرّس أو مُدرّسة الفصل بذلك.

سوف تقوم المدرسة بتبليغك بموعد التطعيم في الوقت المناسب.

يتم توثيق التطعيم الواقية باستخدام لقاح كوميرناتي® بشكل إلكتروني في دفتر التطعيم الإلكتروني. ولذلك، يرجى منك الموافقة على إرسال بيانات طفلك إلى قسم الخدمات الصحية لكي يتم إنشاء إحصاءات تطعيم مجهولة المصدر لوزارة الشؤون الاجتماعية والصحة والرعاية وحماية المستهلك.

يُرجى إعطاء طفلك جميع وثائق التطعيم (دفتر الصحة، هوية التطعيم، بطاقة التطعيم) وسجلات أية أمراض مزمنة أو أدوية طويلة الأمد لكي يتمكن الطبيب أو الطبيبة من تشخيص الحالة بأفضل شكل ممكن.

شكراً لاهتمامكم بالتطعيم الواقية ضد سارس - كوف 12!